

## **Przygotowanie do badania tomografii komputerowej**

W dniu badania proszę zgłosić się na czczo. Należy zabrać ze sobą :

- dowód osobisty
- dokumentację leczenia ,jeśli taka istnieje
- wynik poziomu kreatyniny ( wykonany maksymalnie dwa tygodnie przed terminem badani)

**UWAGA!** Pacjent przyjmujący leki zawierające METFORMINĘ ( w razie wątpliwości zapytać lekarza rodzinnego ) powinien odstawić lek na 48 godzin przed badaniem.

## **Przygotowanie do zdjęcia kręgosłupa L – S**

- w przeddzień badania zjeść lekki obiad około godz. 16.00
- zażyć środki przeczyszczające ( np Bisacodyl )
- przyjąć środki na odgazowanie ( np. Espumisan , Esupticon ) 3 x 2 kapsułki
- w dzień badania na czczo zgłosić się do Pracowni RTG celem wykonania badania

## **Przygotowanie do badania USG jamy brzusznej**

- W przeddzień badania przyjąć środki na odgazowanie ( np. Espumisan ) 3 x 2 kapsułki.
- Rano zjeść lekkie śniadanie i przyjąć 2 kapsułki środka na odgazowanie .Obiady nie jeść.
- Dwie godziny przed badaniem wypić dwie szklanki wody przegotowanej.
- Z pełnym pęcherzem moczowym zgłosić się na badanie.
- Wskazane dostarczenie wyniku badania USG wcześniej wykonanego.

## **PRZYGOTOWANIE DO BADANIA UROGRAFII**

**Urografia jest to rodzaj badania obrazowego, które pozwala na uwidocznienie nerek i dróg odprowadzających mocz. Podczas badania pacjentowi podaje się do naczyń krwionośnych środek cieniujący, który następnie jest wydalany przez nerki i pozwala na zobrazowanie kolejno kielichów i miedniczek nerkowych, moczowodów i pęcherza moczowego.**

Na badanie należy zgłosić się ze skierowaniem od lekarza!!!

Przed wykonaniem badania UROGRAFII należy zastosować się do poniższych zaleceń.

### **1. Na 2-3 dni przed badaniem :**

- **Wykonać badanie krwi na poziom kreatyniny ( w Laboratorium ) ( na czczo !!!)**
- zacząć zażywać **Espumisan** lub **Esputicon** 3 razy dziennie po 2 kapsułki. Oba te leki mają

dokładnie takie samo działanie, odgazowują i można je bez recepty nabyć w każdej aptece.

## 2. W dniu poprzedzającym badanie należy:

- nie spożywać pokarmów ciężkostrawnych, wzdymających oraz napojów gazowanych - ostatni posiłek zjeść nie później niż o 18 -tej /płynny/ dnia poprzedzającego badania.

## 3. W dniu badania należy:

- zażyć rano 2 kaps. Esputiconu lub Espumisanu
- na badanie zgłosić się **na czczo**
- zadbać o wypróżnienie
- nie palić papierosów i nie pić kawy
- pacjenci, którym badanie wyznaczono po godzinie 14-tej **nie mogą jeść na 6 godzin przed planowaną godziną badania** – płyny wolno spożywać.
- jeżeli wcześniej były wykonywane badania USG **należy przynieść ze sobą ich wynik**

Uwaga !

1. Prosimy o bezwzględnie o poinformowanie lekarza kierującego i personelu pracowni Rtg o uczuleniu na środki kontrastowe, alergiach, lub schorzeniach nerek zwłaszcza, gdy wynik nadania klirensu kreatyniny GFR jest poniżej 30 ml/ min.

2. Pacjentki w ciąży powinny bezwzględnie powiadomić o tym personel pracowni Rtg.

3. Pacjent powinien pamiętać, aby w czasie badania poinformować, o nagłych dolegliwościach.

4. Pacjenci przyjmujący preparaty metforminy / metformax, siofor, glucophage, avamina, formetic/ powinni zaprzestać jej przyjmowanie na 48 godzin przed planowanym badaniem i na 24 godziny po badaniu – zmianę leczenia na okres badania uzgodnić ze swoim lekarzem.

**5. Bezwzględnym przeciwwskazaniem do wykonania badania jest pierwszy trymestr ciąży I. Drugi i trzeci trymestr ciąży są przeciwwskazaniem względnym – w zależności od wskazań medycznych .**

**U kobiet w okresie rozrodczym zalecane jest wykonywanie badań radiologicznych w pierwszej fazie cyklu miesięczkowego – bezpośrednio po miesiączce , w razie wątpliwości pacjentka powinna wykonać test ciążowy.**

03.06.2016